

СТ А Н О В И Щ Е

От д-р Деян Николов Давидов,
Началник отделение по химиотерапия,
УМБАЛ- Д-р Г. Странски- Плевен- ЕАД
Относно приложение на MAOLO табл.

Лекарството MAOLO табл. е прилагано в Отделение по Химиотерапия на УМБАЛ- Д-р Г. Странски- Плевен- ЕАД в продължение на една година- в периода октомври 2009- септември 2010 г. Наблюдавани са десет болни с различни злокачествени заболявания в напреднал или метастазирал стадий, провеждащи химиотерапия. Разпределението на болните по диагнози е както следва:

- с карцином на шийката на матката- 4
- с карцином на млечната жлеза- 3
- с карцином на стомашно- чревния тракт- 1
- с карцином на белия дроб- 2

При всички болни като ефект от приложената химиотерапия е наблюдавана левкопения в лека или средна степен по скалата на СЗО. При тези болни е прилагано лечение с MAOLO табл. в доза 3x1 табл в продължение на десет дена. В резултат на приложената терапия се наблюдава възстановяване на стойностите на левкоцитите до нормата след пет до десет дена лечение, което ни позволи да продължим планираната цитостатична терапия. Спиране на химиотерапията не се наложи при нито един болен. Не се наблюдаваха значими странични ефекти. При един болен се разви гадене от втора степен, което беше купирано с приложението на антиеметик и приемът на MAOLO продължи.

Като цяло считаме, че MAOLO има своето място за лечение на левкопения при болни, провеждащи химиотерапия. Лечението не е свързано с неудобства за пациента, не се наблюдават сигнификантни странични ефекти и приложението на MAOLO позволява планираните курсове химиотерапия да се проведат.

14.02.2011 г.

гр. Плевен

/д-р Д. Давидов, нач. отделение /

