



КЛИНИКА ПО ХЕМАТОЛОГИЯ

4002 Пловдив, бул. В.Априлов 15А, ет.3, Началник клиника - Доц. Д-р Ст. Горанов, д.м., Тел 602 481

Клинични наблюдения относно действието на препарата
„МАОЛО“ – капсули

Производител: Агенция по качество и безопасност на стоките „СМИЛО“.

Болнична база: Клиника по Хематология при УМБАЛ „Св. Георги“ гр. Пловдив.

Общ брой на болни: 10 (десет).

От тях с диагнози:

1. В.Д.К. 45г. с Dg: NHL-DLBCL ; Th схема// CHOP;
2. Т.И.К. 70г. с Dg: NHL-DLBCL ; Th схема// CHOP;
3. Б.Ц.К. 66г. с Dg: NHL-MALT ; Th схема// CVP ;
4. М.Т.С. 69г. с Dg:LPL ; Th схема// CVP ;
5. Т.А.О. 43г. с Dg: Morbus Hodgkin ; Th схема// BEACOPP;
6. Г.Д.М. 20г. с Dg: NHL- Хистиоцитен сарком Th схема// CHOP-BLAM ;
7. М.Х.Х. 47г. с Dg: NHL- Анапластичен Т- едроклетъчен ;Th схема// ESHAP.
8. Н.П.П. 18г. с Dg: Morbus Hodgkin ; Th схема// DHAP;
9. П.Й.М. 66г. с Dg: NHL-DLBCL ; Th схема// CHOP- Vp;
10. М.Т.Б. 80г. с Dg: NHL-DLBCL ; Th схема// CVP.

Начин на приложение на препарат: Препарата бе прилаган per os , по 2 таблетки дневно в продължение на 15 дни, от първия ден на започването на ПХТ курса.

Мониториране: Хематологичните показатели бяха проследени трикратно, на първия ден, на 7-ия и 15-ия ден от започването на приемането на препарата.

Клинични наблюдения: При осем от пациентите левкоцитния брой остана в референтните граници, не се регистрира спад на левкоцитите при двукратното мониториране/ 7 и 15 ден/. При един от пациентите на 7-ия ден се регистрира спадане на левкоцитния брой под нормалните стойности , след което на 15-ия ден се нормализира.. При един от пациентите се регистрира легкостепенна левкопения до 15-я ден.

Заключение: При прилагането на препарата при пациенти с малигнине лимфоми не се наблюдаваха странични действия и непоносимост от страна на пациентите. Понасят се доста добре от пациентите.

Изследовател: Д-р Грекланов

Ръководител на темата: Проф. Д-р Ст. Горанов, д.м.н.

гр.Пловдив
28.06.2010г.